

INFORMATION SUR LES INFILTRATIONS RACHIDIENNES FORAMINALES

Une infiltration foraminale de cortisonique sous scanner vous a été prescrite. Ce geste ne sera pratiqué qu'avec votre consentement.

En quoi consiste cette infiltration foraminale sous scanner ?

L'infiltration foraminale consiste à injecter un médicament anti-inflammatoire à base de cristaux de cortisone à proximité du nerf dont l'irritation est responsable de vos douleurs, à l'endroit où le nerf sort du canal rachidien, au niveau du foramen. Le but de cette infiltration est de supprimer l'inflammation impliquée dans la pathogénie des douleurs, et donc de réduire ou supprimer les douleurs à court terme.

Ce geste sera effectué sous scanner, cette technique permettant de sécuriser le geste et de contrôler la progression de l'aiguille et la diffusion du médicament. La durée du geste est d'environ 20 minutes.

Pendant l'infiltration, suivez les recommandations du médecin et du technicien. Votre coopération est essentielle, elle contribue à la rapidité du geste et diminuera les risques de douleurs et de complication.

Vous serez installé à plat ventre sur la table du scanner aussi confortablement que possible.

Après une désinfection soigneuse de la peau, le médecin restera à vos côtés et procédera au geste sous guidage scanographique. Les sensations ressemblent à une prise de sang, sauf que celle-ci sera effectuée en bas du dos ou au niveau du cou.

Un produit de contraste iodé sera injecté localement pour vérifier la bonne position de l'aiguille afin d'autoriser l'injection du médicament.

Lors de l'injection du médicament, vous pouvez ressentir une douleur, une pression au niveau de l'injection, ce qui traduit une bonne position de l'aiguille. Dans ce cas, il est important de ne pas bouger et de le signaler au médecin qui restera à vos côtés pendant toute la procédure.

Pour ce type d'infiltration, une concertation pluridisciplinaire préalable sera indispensable afin de discuter du geste et de valider l'indication.

Quels sont les bénéfices et limites de l'infiltration ?

Cette infiltration est indiquée dans le cadre d'une prise en charge globale médicale et chirurgicale.

Cette infiltration peut diminuer votre douleur mais le résultat n'est pas constant.

L'efficacité de ce type d'infiltration à moyen et long terme est difficile à connaître étant donné l'évolution souvent favorable des radiculalgies lorsqu'elles sont dues à un conflit disco-radulaire.

Les images de votre examen seront produites à l'aide de rayons X. En matière d'irradiation, aucun risque n'a été démontré chez les patients, compte tenu des doses utilisées et des précautions prises pour limiter la zone examinée. Toutefois des précautions concernant les femmes enceintes doivent être prises.

Pour la prise de rendez-vous, il est important de répondre aux questionnaires fournis, notamment sur la prise de traitement anticoagulant, la présence d'allergies et sur les données cliniques. Après consultation de votre dossier, vous serez contacté par le secrétariat, soit directement pour prendre rendez-vous pour une infiltration, soit pour une consultation préalable.

Que devez-vous faire le jour de l'examen ?

À l'exception des médicaments que l'on vous aura précisément demandé d'arrêter, vous prendrez normalement votre traitement en cours. Il n'y a pas de nécessité d'être à jeun. Il est conseillé d'être accompagné.

Le jour de l'examen, il est important d'apporter : votre pièce d'identité / le résultat de la prise de sang qui vous aura été prescrite / votre ordonnance / vos anciens bilans d'imageries qui n'ont pas déjà été fournis / ce questionnaire rempli et signé.

Quelles sont les complications ?

Toute intervention sur le corps humain dans des conditions de compétence et de sécurité maximale comporte un risque de complication.

Comme pour toute ponction, il existe un très faible risque d'infection, d'hématome et de migration vasculaire.

De façon exceptionnelle, des accidents neurologiques à type de paralysies ont été décrits. Toutes les mesures de précautions sont prises pour s'en affranchir.

Les résultats : le compte rendu écrit et les clichés vous sont remis avant votre départ.

De retour à votre domicile, un repos en position allongée après l'infiltration est recommandé pour une meilleure efficacité de l'infiltration, et du fait d'une possible aggravation transitoire des douleurs suite à l'infiltration.

L'amélioration se manifeste en général à partir de 5 jours après l'infiltration, parfois plus.

Le pansement est à changer chaque jour pendant 3 jours, les douches sont autorisées, en revanche les bains ou les baignades sont à éviter tant que le point de ponction n'est pas cicatrisé.

La conduite automobile est autorisée en cas de nécessité après l'infiltration.